

Zdravotní překážky darování krve

ODBĚR JE MOŽNÝ NEJDŘÍVE ZA:

| | |
|-----------------------------|--|
| 24 hod | <ul style="list-style-type: none">• po očkování proti tetanu, chřipce, žloutence A, meningokoku, pneumokoku, klíšťové encefalitidě, karcinomu děložního čípku, choleře, covidu-19 (zde v případě použití mRNA, virové vektorové nebo proteinové vakcíny)• po malém nekrvavém ošetření zubů stomatologem či zubním hygienikem |
| 7 dnů | <ul style="list-style-type: none">• po zhojení ambulantně provedeného chirurgického zákroku (šití drobné rány, odstranění stehů atd. – malé chirurgické výkony v místním znecitlivění)• po vytržení zubu bez infekční komplikace (bez antibiotické terapie), kořenová výplň• po očkování proti koronaviru SARS CoV-2 (vakcíny Pfizer, Moderna, Novavax, Sanofi) |
| 14 dnů | <ul style="list-style-type: none">• po uzdravení z kašle, chřipky, horečky, průjmu• po dobrání antibiotik• po výsevu oparu, pokud je zhojen• od uzdravení po závažné alergické reakci |
| 1 měsíc (28 dní) | <ul style="list-style-type: none">• po přísátí klíštěte, nebyla-li reakce (kožní změny nebo zvýšená teplota až horečka)• po očkování proti koronaviru SARS CoV-2 (vakcíny Astra Zeneca, Johnson&Johnson), tuberkulóze, zarděnkám, spalničkám, obrně (p.o.), příušnicím, žluté zimnici, žloutence typu B• po kontaktu s infekční chorobou, pokud není znám původce infekce• po návratu z mimoevropské země, kde se nevyskytuje malárie a/nebo evropské země s rizikem přenosu západonilské horečky (viz seznam zemí s rizikem WNV), pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo v období do 1 měsíce od návratu• ledvinová kolika• po vysazení některých léků používaných k léčbě zvětšené prostaty |
| 2 měsíce | <ul style="list-style-type: none">• po kontaktu s infekční žloutenkou typu A nebo E• po očkování proti pravým nebo opičím neštovicím |

| | |
|-----------------|---|
| 4 měsíce | <ul style="list-style-type: none">• po operaci, po katetrizaci, po invazivních vyšetřovacích nebo léčebných metodách• po transfuzi (v ČR)• po endoskopickém vyšetření nebo zákroku (gastroskopie, kolonoskopie, artroskopie, atd.)• po akupunktuře, tetování, piercingu, propichování uší, permanentním make-upu• po kontaktu se žloutenkou typu B, C (člen domácnosti, sexuální kontakt)• po poranění, potřísnění sliznice či poraněné kůže potencionálně infekčním biologickým materiálem (např. krví)• po pobytu ve vězení• po vyléčení kapavky |
| 6 měsíců | <ul style="list-style-type: none">• po ukončení léčby boreliózy• po návratu z malarické oblasti (většina zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky), pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo v období do 6 měsíců od návratu• po porodu či předčasném ukončení těhotenství• po klinickém uzdravení z toxoplazmózy |
| 1 rok | <ul style="list-style-type: none">• po uzdravení ze septického stavu• po úplném uzdravení z infekční mononukleózy, klíšťové encefalitidy• po vyléčení infekční žloutenky typu A nebo E• po očkování proti vzteklině po pokousání zvířetem• po některých lécích na akné• po uzdravení z břišního tyfu, paratyfu (při vyloučení nosičství) |
| 2 roky | <ul style="list-style-type: none">• po uzdravení z brucelózy, listeriózy, tularemie, horečky Q, plicní tuberkulózy, osteomyelitidy (zánět kostí způsobený bakteriemi)• po vyléčení bazaliomu (kožní nádor) |
| 3 roky | <ul style="list-style-type: none">• po ukončení léčby epilepsie bez klinických projevů |
| - | <ul style="list-style-type: none">• po odstranění sádrové dlahy na dolní končetině |

V případě nejistoty, prosíme, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem transfuzního oddělení nejlépe ještě před rozhodnutím přijít darovat krev.

Kontakt: evidence dárců krve tel.: 477 113 468, 477 113 437

e-mail: UL_Darci@kzcr.eu