



Oddělení klinické hematologie Laboratoř klinické hematologie

Primář MUDr. Ullrychová Jana

Vedoucí hematologické laboratoře Ing. Pavla Bradáčová
Sociální péče 12A, Ústí nad Labem, budova C, 4 podlaží
Tel.: +420 477 112 486, koagulace +420 477 112 489

Číslo žádanky:

Přijal, čas:

Žádanka na hematologické vyšetření

Jméno pacienta		Statim	
		Datum:	
Pohlaví	Muž	Žena	Čas odběru:
Číslo pojištěnce	Datum narození:		Odebral:
Pojišťovna	Kontakt na pacienta:		Razítko žadatele:
Diagnóza			
IČP, odbornost			
Antikoagulační léčba ¹			Podpis lékaře:
Druh vzorku	Plná krev	Punktát	Jiné
Hematologie		Speciální hematologie	
Krevní obraz	Tělní tekutiny, likvor	Tromboprottilátky	HbF kvalitativně (sklo)
Diferenciál leukocytů ²	ICIS skóre infekční sepse	Granuloprottilátky	ORE ³
Retikulyocyty	COVID prognostické skóre	anti-vnitřní faktor	Autohemolýza ³
IPF nezralé trombocyty		anti-parietální buňky	Kryohemolýza ³
Trombocyty v ThromboExactu ⁶	Nátěr na schistocyty		Heinzova tělíska ³
Koagulace		Speciální koagulace	
PT (Quick), INR	Trombofilní stavy	Koagulační faktory	Funkce PLT Multiplate ⁷
APTT	Protein C	Faktor II	ADP test hirudin ⁷
Fibrinogen	Protein S	Faktor V	ASPI test hirudin ⁷
Antitrombin	APC rezistence	Faktor VII	TRAP test hirudin ⁷
D-dimery	LA	Faktor X	Funkce PLT opticky ⁴
Trombinový čas	FVIII	Faktor VIII	ADP ⁴
Etanolgelifikační test	Antifosfolipidové prottilátky	Faktor IX	Arachidonová kyselina ⁴
Euglobulinová lýza ⁴	anti-cardiolipin IgG, IgM	Faktor XI	Epinefrin ⁴
Monitorování léčby ¹	anti-β2 GP-I IgG, IgM	Faktor XII	Collagen ⁴
anti-Xa (LMWH)	anti-β2 GP-I Doména I	Faktor XIII	Ristocetin ⁴
anti-Xa (UFH)	anti-annexin IgG, IgM	Inhibitor faktoru VIII	
Apixaban	anti-PS/PT IgG, IgM	Inhibitor faktoru IX	Syndrom lepivých destiček ⁵
Rivaroxaban		Faktor VIII chromogenní	
Dabigatran DTI		Emicizumab	Primární hemostáza
		von Willebrandův faktor	Screening PFA200
Kys.acetylsalicylova ASA	Lupus antikoagulans	VWF: Screening PFA200	
Clopidogrel, prasugrel, ticlopidin, ticagrelor, atd.	Screeningové testy	VWF: Antigen	Jiné
	Korekční testy ⁶	VWF: Aktivita	HIT Heparinem induk.tromboc.
	Konfirmační testy ⁶	VWF: Colagen vazebná akt.	ADAMTS13 aktivita, inhibitor
	Cirkulující antikoagulans		Retrakce koagula ⁴

Vysvětlivky

- Je nutno vždy uvést antikoagulační a antiagregační léčbu !
- V případě nalezené patologie, provedeme dif mikroskopicky
- Provádíme ve středu po předchozím objednání, zkumavky vydáme.
- Provádíme po předchozím objednání.
- Odběr provádíme v naší ambulanci po předchozím objednání.
- Provádíme při pozitivitě screeningu LA.
- Odběr do Hirudinu

Množství materiálu

Koagulace – 2,7 ml (kojenci 1,8 ml)
Trombofilní stavy – 2 x 4,5 ml
LA – 2 x 4,5 ml, 1x 5ml žlutá
Agregace – 2 x 4,5 ml
Dva faktory – 4,5 ml
Inhibitor – 2 x 4,5 ml
VWF – 4,5 ml

Typy zkumavek

Hematologie – K₃EDTA 2 ml (kojenci 0,5 ml)
Trombo.granulo.prottilátky – 6 ml sraž. žlutá
Koagulace – Citrát sodný
Antifosfolipidové prottilátky - 7 ml sraž. žlutá
HIT - 5 ml sraž.žlutá
⁸TromboExact - zkumavku vydáme
⁹ESR - zkumavka 1,6 ml