

## Instrukce pro pacienty před odběrem SPS – Syndrom lepivých destiček

- Vyšetření provádíme po předchozím telefonickém objednání na telefonním čísle:

**477 112 484, 477 112 489**

- K odběru krve se dostavte do hematologické ambulance **nalačno**.
- Dodržte prosím přesně stanovený čas.
- Od půlnoci nekouřit, nepít kávu a čaj, ale **dostatečně se napít vody**.
- Před samotným odběrem vyloučit fyzickou námahu a stres.

### **10 dní před vyšetřením:**

- Neužívat léky obsahující kys. acetylsalicylovou (Anopyrin, Aspirin, Acylpyrin, Godasal).
- Neužívat léky proti bolestem kloubů (Brufen, Ibuprofen, Ibalgin, Ibumax, Diclofenac, Voltaren).
- Neužívat antibiotika – penicilin a antidepresiva.
- Nejíst v nadměrné míře ryby, česnek, nepít odvary z bylin.
- Neužívat ginkgo biloba.
- Při nedodržení těchto pokynů mohou být výsledky vyšetření ovlivněny, pokud budete muset z nějakých důvodů instrukce porušit, zavolejte prosím, přebjdnáme Vás.
- Vyšetření je nutno provést 2x, s minimálním odstupem 14 dnů

### **Kontakt:**

- Oddělení klinické hematologie, budova C, 4.podlaží
- Hematologická ambulance (odběr), budova C, 4.podlaží
- Masarykova nemocnice, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
- Sociální péče 12A
- 401 13 Ústí nad Labem